

# ORIENTAÇÕES PARA BIÓPSIA DE PRÓSTATA

## USO DE MEDICAMENTOS

Se o paciente fizer uso de medicações que alterem a coagulação sanguínea, suspender o uso dessas medicações no período de 8 dias antes da data do exame.

– ex. Aspirina, Doril, Bulferin, Somalgin, Marevan, Xarelto e Clopidogrel

## PREPARO

O Médico que realiza o exame na nossa clínica, no ato da marcação, concederá a receita médica para que o paciente adquira o remédio abaixo:

FORITUS 500MG \_\_\_\_\_ 10 COMPRIMIDOS.

Tomar 01 comprimido via oral de 12 em 12 horas.

Iniciar na véspera do exame (às 05:00h / 17:00h) por 05 dias.

FOSFOMICINA (Monuril) \_\_\_\_\_ 02 ENVELOPES.

Dissolver 01 envelope em meio copo com água (100 ml).

Ingerir via oral às 05:00h no dia do exame e repetir em 24h.

## VÉSPERA DO EXAME

Aplicar 01 (um) ENEMAPLEX ou MINILAX à tarde, após o almoço.

No jantar utilizar dieta líquida apenas (Ex.: caldos, leite, sucos, gelatina e chás).

Aplicar 01 (um) ENEMAPLEX ou MINILAX à noite, após o jantar.

Iniciar JEJUM às 00:00h da véspera, inclusive de água e líquidos.

Manter o uso das medicações habituais para tratamento de Hipertensão arterial, cardiopatias e Diabetes (exceto os QUE ALTERAM A COAGULAÇÃO).

**ATENÇÃO: O paciente deverá vir acompanhado para realizar o exame.**

## CUIDADOS APÓS A BIÓPSIA

Repouso de 24h, inclusive não dirigir.

Se sentir dor e/ou febre, tomar PARACETAMOL, pois após o exame pode ocorrer febrícula.

Pode ocorrer pequeno sangramento retal, urinário ou seminal.

No caso de sangramento retal, banho de assento gelado.

**ATENÇÃO: Procure o médico em caso de febre alta (>38° C) persistente ou hemorragia com coágulos.**